H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Bloedtransfusie

WELKOM

BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL

H. HARTZIEKENHUIS
MOL

doet het met zorg, veilig en kwaliteitsvol!

Kwaliteitslabel

NIAZ®
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg

2017 - 2022

Het H. Hartziekenhuis Mol is een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd ziekenhuis.

INHOUD

Inleiding	4
Waarom een bloedtransfusie?	5
Hoe verloopt zo’n bloedtransfusie?	6
Hoe veilig is een bloedtransfusie?	7
Bijwerkingen van bloedtransfusie?	8
Kan ik een bloedtransfusie weigeren?	9
Meer weten?	9
Nota’s	10

INLEIDING

Tijdens uw opname in het ziekenhuis bestaat de kans dat u bloed toegediend moet krijgen, een zogenaamde bloedtransfusie. In deze folder vindt u informatie over bloedtransfusie. Als u eventueel vragen zou hebben, aarzel dan niet om deze aan uw behandelde arts voor te leggen.

WAAROM EEN BLOEDTRANSFUSIE?

Meer dan 70% van de mensen krijgt in zijn/haar leven één of meerdere bloedtransfusies. Dagelijks worden er in België dan ook vele honderden transfusies uitgevoerd. Het betreft onder andere slachtoffers van ongevallen, patiënten die een operatie ondergaan, alsook patiënten die behandeld worden voor chronische bloedarmoede.

Bloedtransfusies worden door uw arts voorgeschreven als dat voor de behandeling noodzakelijk is. Uw arts doet dit echter niet zonder uw toestemming (tenzij er sprake is van een acute situatie). Om u te helpen tot een weloverwogen keuze te komen, zal uw arts u vooraf duidelijk inlichten over:

- de reden van de bloedtransfusie;
- de risico's die aan de transfusie verbonden zijn;
- de risico's die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie;
- (eventuele alternatieven voor de bloedtransfusie (indien mogelijk)).

Bij een bloedtransfusie worden meestal rode bloedcellen toegediend voor het corrigeren van een aanwezige bloedarmoede, maar ook andere bloedbestanddelen kunnen getransfuseerd worden. In het geval van een te laag aantal bloedplaatjes zal men bijvoorbeeld bloedplaatjes toedienen. Bij een gestoorde stolling ten gevolge van groot bloedverlies of verstoorde aanmaak van de stollingseiwitten kan men plasma of stollingseiwitten toedienen.

HOE VERLOOPT ZO'N BLOEDTRANSFUSIE?

Na een grondige controle van uw bloedgroep en geschiktheid van het bloedproduct voor u zal het bloedproduct via een infuus in een bloedvat (meestal van de onderarm) worden toegediend. De duur van de transfusie varieert van een half tot 4 uur afhankelijk van het bloedproduct en kan steeds worden onderbroken indien nodig.

HOE VEILIG IS EEN BLOEDTRANSFUSIE?

Om bloedtransfusies zo veilig mogelijk te maken, worden de volgende maatregelen genomen:

- alleen gezonde mensen zonder risicogedrag kunnen bloeddonor worden;
- donors (de mensen die bloed afstaan voor transfusies) geven hun bloed vrijwillig en worden hiervoor niet betaald;
- al het donorbloed wordt gecontroleerd op een aantal belangrijke ziektes die via bloed overgedragen kunnen worden zoals virale geelzucht, syfilis en infectie met het HIV-virus. Wanneer blijkt dat het bloed mogelijk besmet is, wordt het direct vernietigd.

Er blijft - ondanks alle voorzorgen - een zeer kleine kans bestaan op besmetting met een nog onbekend virus of ziektekiem door de bloedtransfusie. Deze kans is evenwel bijzonder klein: zo is de kans dat een eenheid bloed besmet is met HIV kleiner dan één op een miljoen.

Het is belangrijk dat het bloed dat iemand toegediend krijgt bij hem of haar ‘past’. Daarom nemen wij bloed bij u af om uw bloedgroep vast te stellen. Als u geen bloedgroepkaart heeft, zal dit gebeuren aan de hand van twee onafhankelijk van elkaar genomen bloedstalen.

Sommige mensen hebben afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Deze stoffen kunnen gevormd zijn bij een zwangerschap of vroegere bloedtransfusie. Als dat het geval is, kan het soms langer duren voor er in het laboratorium ‘passend’ bloed beschikbaar is. Ten slotte zal de verpleegkundige, voordat u een bloedtransfusie krijgt, steeds controleren of het zakje bloed in kwestie inderdaad voor u bestemd is.

BIJWERKINGEN VAN BLOEDTRANSFUSIE?

Soms treden er bijwerkingen op tijdens of na de bloedtransfusie. Daarom is het belangrijk dat het verplegend personeel u kan opvolgen.

Mogelijke bijwerkingen – tijdens of na de bloedtransfusie – kunnen zijn:

- Koorts
- Koude rillingen
- Jeuk of een rode huid
- Lendepijn en flankpijn
- Hypotensie en bewustzijnsverlies
- Kortademigheid en piepende ademhaling
- Misselijkheid en braken
- Pijn t.h.v. de injectieplaats

Als u één van deze klachten voelt, waarschuw dan de verpleegkundige. Ook wanneer u zich enkele dagen na transfusie niet goed voelt, last hebt van geelzucht of donkere urine opmerkt, raadpleeg dan uw behandelende arts. Als u dringend uw behandelende arts wenst te contacteren dan kan dit via de spoedafdeling van het ziekenhuis of de verpleegafdeling waar u verbleef.

KAN IK EEN BLOEDTRANSFUSIE WEIGEREN?

Ja, dat kan u. Bedenk daarbij wel dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn om uw gezondheidstoestand te verbeteren of te handhaven. Bloedtransfusies zijn vaak levensreddend. Sommige operaties of behandelingen kunnen zelfs niet worden uitgevoerd zonder bloedtransfusie. Een bloedtransfusie weigeren betekent meestal een groter risico voor uw gezondheid dan een bloedtransfusie ontvangen.

Bespreek uw twijfels ten aanzien van de bloedtransfusie tijdig met de arts die u behandelt.

MEER WETEN?

In deze folder hebben wij u het een en ander verteld over bloedtransfusie. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, bespreek deze dan zeker met uw behandelende arts.

NOTA'S

H. HARTZIEKENHUIS
MOL

H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Datum laatste aanpassing: 5 juni 2018

Naam auteur / verantwoordelijke:
Dr. M. Van Ingelgom

Kwalificaties auteur: Klinisch bioloog

VDE 051 - juni 2018

H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43