



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Contrastextravasatie

WELKOM

BIJ HET
H. HARTZIEKENHUIS
MOL

U heeft een onderzoek gehad waarbij wij u contraststof toegediend hebben. Deze contraststof werd via een infuus in een bloedvat gespoten.

Helaas is tijdens de injectie (een deel van) de contrastvloeistof buiten het bloedvat terecht gekomen. Dit heet extravasatie.

Wat is contrastextravasatie?

Voor het uitvoeren van bepaalde onderzoeken is het nodig om een contrastvloeistof toe te dienen.

Als deze contrastvloeistof buiten het bloedvat terecht komt, heet dat extravasatie.

Meestal geeft dit weinig hinder maar soms ontstaat er een harde, pijnlijke zwelling op de plaats waar het infuus gezeten heeft. De huid rond de insteekplaats kan rood verkleuren en er kan jeuk of een branderig gevoel optreden.

Uw lichaam zal de contrastvloeistof zelf afvoeren, de zwelling zal verdwijnen en het pijnlijke gevoel zal ook verminderen. Dit kan een paar dagen tot een week duren.

Aanpak

De behandeling is al in de onderzoeksruimte gestart.

De medewerker heeft de huid rond de insteekplaats gemasseerd en Reparil gel op de huid aangebracht.

Deze gel zal de zwelling en de pijn verminderen en werkt ontstekingswerend. Hierover werd een stevig verband aangelegd.

Er wordt een röntgenopname gemaakt om de uitgebreidheid van de extravasatie te bepalen en de radioloog zal dit vermelden in zijn/haar verslag.

Advies

Hoogstand van uw arm: probeer uw arm hoog te houden bij het zitten of liggen en maak regelmatig knijpbewegingen met uw hand. Dit zorgt voor een betere afvoer van het vocht. Laat uw arm zo weinig mogelijk naar beneden hangen!

Pijn verzachten:

- Breng 3 à 4 keer per dag Reparil gel aan rond de insteekplaats (niet inwrijven!) en ververs het verband.
- Tijdens de eerste 24 uur kan u de pijn verzachten door de zwelling te koelen met ijsblokjes in een washandje of een coldpack (nooit rechtstreeks op de huid aanbrengen, wikkel in een handdoek). Koel niet langer dan een kwartier en wacht minstens een half uur voordat u weer gaat koelen.

Bij de volgende klachten neemt u best contact op met uw huisarts of met de spoedgevallendienst (014712392):

- Ontstekingsverschijnselen rond de insteekplaats
- Tintelingen, verkramping of gevoelloosheid van de vingers

Vragen

Bij vragen kan u contact opnemen met de afdeling radiologie op het nummer 014712076.

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke verspreiding of reproductie zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Datum laatste aanpassing: 27 januari 2020

Naam auteur / verantwoordelijke: Dr. S. Van de Perre

Kwalificaties auteur / verantwoordelijke: Radioloog



H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be