

## Soorten verbanden

### Vetverband

Dit werd aangebracht op een diepere huidwonde en schaafwonde om verkleving met het verband te vermijden en een vlotte wondheling toe te laten. Dit verband wordt best na een 2-tal dagen vervangen door uw huisarts of op consultatie bij de specialist in ons ziekenhuis.

### Steristrip

Deze smalle kleefpleistertjes worden aangebracht om hechtingen te bedekken of in de plaats van hechtingen bij zeer kleine snijwondjes.

Deze mag u zelf na 5 à 7 dagen verwijderen.

Bevochtig de steristrips, wacht 10 minuten en maak ze voorzichtig los, trek steeds naar de wonde toe.

U kunt hiervoor ook uw huisarts raadplegen.

### Wondlijm

Deze speciale medische lijm valt vanzelf af als de wonde geheeld is.

Zorg ervoor dat:

- \* De wonde rein en droog blijft gedurende de eerste 5 dagen.
- \* Laat het verband, zo mogelijk, op de wonde gedurende deze 5 dagen.
- \* Niet gaan zwemmen of baden.
- \* De lijm niet losmaken.



**H. HARTZIEKENHUIS**  
**MOL**

Verzorging van een gehechte wonde

**WELKOM**  
**OP ONZE**  
**SPOEDGEVALLEN**



**H. HARTZIEKENHUIS**  
**MOL**

H. Hartziekenhuis Mol  
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol  
Tel.: 014/71 20 00  
E-mail: [info@azmol.be](mailto:info@azmol.be)  
[www.azmol.be](http://www.azmol.be)

## Inleiding

Wij hebben u opgevangen en verzorgd op de spoedgevallendienst nadat u verwond werd. U liep een letsel op waarbij de huid en eventuele diepere weefsels beschadigd werden.

De wonde werd gehecht onder plaatselijke (lokale) verdoving.

Hierdoor voelde u tijdens het hechten weinig of niets. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel terug.

De arts heeft u eventueel pijnstillers en/of antibiotica voorgeschreven.

## Bij de thuisverzorging

- \* De wonde schoon en droog houden.
- \* Het verband erop laten gedurende 2 dagen en dan vervangen.
- \* Is het verband erg bebloed of vuil, vervang het. Reinig de wonde zacht met een steriel kompres en een niet prikkelend ontsmettingsmiddel (Isobetadine dermicum) en breng een nieuw verband aan.  
Deze producten zijn verkrijgbaar in de apotheek.
- \* De gewonde plaats zoveel mogelijk laten rusten.
- \* Vermijd spanning of trekkracht op de wonde.
- \* Pijnstillers nemen zo nodig.

## Verzorging van de wonde

- \* Een wonde op de hoofdhuid: houd deze droog. Verweking van de hoofdhuid en zeeprestjes verhinderen een goede wondgenezing.  
De haren best niet wassen.
- \* Een wonde aan de vingers: houd uw hand zo min mogelijk omlaag.

## Naar de huisarts of neem contact met de spoedgevallendienst

- \* Wanneer de wonde ondraaglijk pijn gaat doen.
- \* Wanneer de wonde gaat ontsteken (rood wordt, warm aanvoelt, ettert,..)
- \* Wanneer de wonde terug openstaat.

## Verwijderen van hechtingen

Dit kan na 8 tot 10 dagen. Na het verwijderen van de hechtingen wacht u best nog 2 dagen om te baden.

De arts heeft u voorgesteld om hiervoor:

- \* Naar uw huisarts te gaan of
- \* Op consultatie bij de specialist te gaan.

## Belangrijk

Meestal krijgt u een kort verslag mee voor de huisarts. Neem dit mee bij uw eerstvolgend bezoek.

Houd er rekening mee dat het 6 maanden kan duren vooraleer de rode kleur van het litteken begint te vervagen.

Voor een eventuele wondverzorging kan u steeds een beroep doen op thuisverpleegkundigen. U kan een lijst via ons bekomen.

We willen er uw aandacht op vestigen dat de behandeling die de geneesheer bij u heeft ingesteld, en ook de adviezen die hij u daaromtrent gaf, kunnen afwijken van de inhoud van deze brochure. Volg in dat geval steeds de instructies van de geneesheer.

Indien de dokter van spoedgevallen u antibiotica voorschreef, is het noodzakelijk deze volledig uit te nemen om de infectie tegen te gaan.

Indien u nog vragen heeft, kan u zich steeds wenden tot uw behandelende geneesheer of een verpleegkundige van onze dienst (014/71 23 92).

## Wij wensen u een spoedig herstel toe