

## Direct contact opnemen

Om problemen voor te zijn, is het belangrijk om regelmatig de aanprikplaats te controleren. Mocht u last hebben van de volgende verschijnselen of klachten, dan is het belangrijk om direct contact op te nemen met uw huisarts:

- de huid waaronder het reservoir ligt (aanprikplaats) is rood, warm, pijnlijk en gezwollen;
- als u koorts heeft, 38.5°C of hoger, en/of koude rillingen;
- een brandend gevoel bij het inbrengen van medicatie;
- als er pijn en/of zwelling optreedt van het gebied rondom de aanprikplaats, bijvoorbeeld de arm of het halsgebied;
- als u denkt dat het systeem verschoven is.

## Kosten

De mutualiteit dekt de volledige kosten voor de plaatsing en de verzorging van de poortkatheter.

## Nog enkele opmerkingen

U kan met een poortkatheter gewoon door het beveiligingspoortje in de winkel en op de luchthaven. Zou dit toch problemen geven, toon dan uw 'identificatiebadge'. Hiermee kunt u aantonen dat u drager bent van dit systeem.

U kan een MRI-scan laten maken, ondanks het feit dat de poortkatheter van metaal is gemaakt.

Het systeem kan ook na de behandeling blijven zitten. Na overleg tussen u en uw dokter kan besloten worden om de poortkatheter te verwijderen.

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol. Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden. Datum laatste aanpassing: 7 maart 2018  
Naam auteur / verantwoordelijke: Dr. M. Martens  
Kwalificaties auteur / verantwoordelijke: Medisch oncoloog



**H. HARTZIEKENHUIS**  
**MOL**

H. Hartziekenhuis Mol  
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol  
Tel.: 014/71 20 00  
E-mail: info@azmol.be  
www.azmol.be



**H. HARTZIEKENHUIS**  
**MOL**

Subcutane poortkatheter

**WELKOM**

**BIJ HET**  
**H. HARTZIEKENHUIS**  
**MOL**

## Beste mevrouw, mijnheer,

Uw dokter heeft een behandeling voorgeschreven waarbij regelmatige toediening van medicatie of andere vloeistoffen direct in het bloedvat noodzakelijk is.

Uw dokter heeft u aanbevolen om een implanteerbare centraal veneuze katheter te plaatsen, ook wel subcutane poortkatheter genoemd. In deze brochure vindt u hierover informatie.

**U heeft een afspraak voor het plaatsen van een subcutane poortkatheter op:**

.....dag ..... / ..... / ..... om ..... uur.


U wordt verwacht in het chirurgisch daghospitaal. U biedt zich best kort van tevoren aan bij de opnamebalie in de inkomhal. De ingreep gebeurt in principe onder plaatselijke verdoving. Een licht ontbijt is toegestaan.

## Wat is een subcutane poortkatheter?

Het is een systeem dat volledig onder de huid wordt geplaatst, meestal onder het sleutelbeen op de borstkas. Het grote voordeel hiervan is dat deze katheter gedurende enkele jaren ter plaatse kan blijven en zeer eenvoudig kan aangeprikt worden. De toegediende medicatie wordt via deze poortkatheter onmiddellijk vrijgegeven in de grote bloedsomloop zodat medicatie veilig kan toegediend worden.

Een poortkatheter systeem bestaat uit twee onderdelen:

1. Het reservoir is een metalen of kunststof schijfje met een doorsnede van 2 à 3 cm, van boven afgesloten door een zelfsluitend siliconenmembraan (kan 1.000 à 2.000 maal aangeprikt worden met een speciale naald).
2. De katheter is een dunne, flexibele slang van siliconen of polyurethaan (een soort rubber).



## Hoe wordt een subcutane poortkatheter geplaatst?

Het is een kleine chirurgische ingreep onder plaatselijke verdoving. De ingreep duurt meestal een half uur tot een uur. U mag dezelfde dag naar huis. Indien de ingreep onder lokale verdoving onmogelijk blijkt, wordt, bij voorkeur nog dezelfde dag, gekozen voor een plaatsing onder volledige verdoving.

In de eerste dagen na de ingreep is de wonde bedekt met een verband. De wondjes kunnen nog een beetje nabloeden en gezwollen zijn en/of een blauwe plek vertonen. Dit is normaal. Na het inbrengen kan er wat spierpijn en een stijf gevoel ontstaan in de schouder, aan de kant waar de poortkatheter is geplaatst. Na verloop van tijd blijft een litteken en een verhevenheid onderhuids zichtbaar. **Na plaatsing krijgt u een kaartje mee waarop staat welke poortkatheter bij u is ingebracht.** Tijdens de eerste paar dagen na de ingreep is het belangrijk dat u geen zware inspanningen of belastende activiteiten verricht. Indien nodig kan de poortkatheter onmiddellijk worden gebruikt.

## Verzorging van een subcutane poortkatheter

De wonde wordt in de regel gesloten met zelfverteerbare draad. Er moeten dus geen hechtingen verwijderd worden. Tien dagen na de ingreep dient u de huisarts te consulteren voor controle. Eens de wonde genezen is, een verband niet meer nodig. Zwemmen, baden en douchen zijn dan niet langer een probleem.

## Hoe werkt de subcutane poortkatheter?

Om toegang tot de poortkatheter te verkrijgen, wordt met een speciale naald door de huid geprikt tot op de bodem van het reservoir. Aangezien de naald door de huid geprikt wordt, zult u hierbij een kleine prik voelen. Vaak wordt een infuus op de naald aangesloten om vloeistof of medicatie toe te dienen. Ook kan bloed worden afgenomen via de poortkatheter door medewerkers met ervaring op een kiemvrije manier. Na elke behandeling wordt de poortkatheter met NaCl 0,9% / ml doorgespoeld om te voorkomen dat deze verstopt raakt door een bloedstolsel. Als de poortkatheter niet in gebruik is, moet deze om de 8 weken worden doorgespoten. Dit gebeurt door een verpleegkundige van het ziekenhuis of uw thuisverpleegkundige.

