



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Gebruik van de Epipen®

WELKOM

BIJ HET
H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Gebruik van de Epipen®

Uw kind is allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen of voor insectenbeten en heeft een ernstige allergische reactie gehad.

Deze reactie kan zich opnieuw voordoen.

Om in de toekomst een ernstige allergische reactie tegen te gaan, heeft uw arts uw kind een Epipen® voorgeschreven.

Wat is een Epipen®?

Een Epipen® is een automatische injectiespuit voor éénmalig gebruik.

Deze injectiespuit bevat een medicijn (adrenaline) dat de gevolgen van een ernstige allergische reactie tegengaat.

Wanneer gebruikt u de Epipen® NIET?

Als uw kind door een insect gestoken is, is een plaatselijke reactie normaal. Dit is géén reden om de Epipen® te gebruiken. Ook als uw kind jeuk in de mond krijgt na het eten van verkeerde voeding, of jeuk of huiduitslag krijgt over het gehele lichaam, hoeft u de Epipen® niet te gebruiken. Wees nu wel alert. Dit kan namelijk een eerste teken van een ernstige allergische reactie zijn.

Wanneer gebruikt u de Epipen® WEL?

Zodra uw kind een ernstige allergische reactie heeft.

Hierbij zijn drie klachten erg belangrijk:

- 1 Moeilijke ademhaling, plots piepende ademhaling of extreme zwelling in de mond (tong of keel);
- 2 Plots erg opvallend bleek worden, na vermoeden contact met gekende allergisch component;
- 3 Verminderd bewust zijn of erger bewusteloos raken.

Dit kan binnen enkele minuten ontstaan als gevolg van een voedsel- of insectengifallergie.

Als u twijfelt of het wel ernstig genoeg is: gebruik de Epipen® dan toch. Als achteraf blijkt dat het geen allergische reactie was, kan het geen kwaad. Neem wel in alle gevallen direct contact op met uw arts. Bij weekend of nacht is dit een afdoende reden om de spoedgevallendienst te raadplegen.


Bewaren

Bewaar de Epipen® beneden 25 °C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Let op de vervaldatum, vraag tijdig een nieuw voorschrift aan uw arts.

Hoe gebruikt u de Epipen®?



1. Verwijder de blauwe beschermdop van de bovenkant.
2. Pak de Epipen® vast met uw vuist.
3. Duw de Epipen® met het oranje uiteinde met kracht op het dijbeen tot u een 'klik' hoort. Dit kan desnoeds door de kleding heen. Schrik niet van de klik en blijf de pen **10 seconden** stevig op het been duwen. Het medicijn wordt nu automatisch toegediend.
4. Verwijder de Epipen® uit het bovenbeen.
5. Wrijf 10 seconden over de injectieplaats.

Bel direct na gebruik van de Epipen® uw arts of een ambulance (112).

De Epipen® werkt maar tijdelijk en een arts zal uw kind verder moeten behandelen. Geef de lege injectiepen aan de hulpverlener, zodat hij weet wat u heeft gebruikt.

Goed gebruik van de Epipen® is van essentieel belang. Zorg dat familieleden, verzorgers en leerkrachten ook weten hoe zij de Epipen® moeten toedienen. Dit kan met behulp van deze instructievideo:

<http://www.epipen.nl>

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van de Epipen® zijn hartkloppingen, stijging van de bloeddruk, rusteloosheid, hoofdpijn en bleekheid. Zodra de Epipen® is uitgewerkt, zijn de bijwerkingen verdwenen. Dit is na 15 tot 30 minuten.

Vragen?

Als u na het lezen van deze brochure vragen heeft, kunt u contact opnemen met de consultatie pediatrie, tel.: 014/71 23 73.

Kindergeneeskunde H. Hartziekenhuis Mol

Dr. E. Box
Dr. D. Dekkers
Dr. P. Givron
Dr. A. Jeunen
Dr. C. Vanwesemael



Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol. Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.
Datum laatste aanpassing: 28 september 2022
Naam auteur / verantwoordelijke: Dr. D. Dekkers
Kwalificaties auteur / verantwoordelijke: Arts kindergeneeskunde



Deze brochure is patient-proof:
Ontwikkeld in samenwerking met de patiënt.