



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

OPAT

Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy
Ambulante parenterale antibioticatherapie

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Wat is OPAT?
3. Voordelen
4. Wie komt in aanmerking?
5. Waar haalt u uw geneesmiddel?
6. Medisch materiaal
7. Duurtijd van de thuis therapie
8. Welke kosten zijn hieraan verbonden?
9. Wat te doen bij problemen

Inleiding

Het Heilig Hartziekenhuis in Mol biedt patiënten die langdurig behandeld worden met intraveneuze antibiotica de mogelijkheid om deze therapie in bepaalde gevallen thuis verder te zetten. U komt hiervoor in aanmerking. Met deze brochure informeren wij u over deze intraveneuze antimicrobiële therapie of 'Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy', afgekort 'OPAT'.

Wat is OPAT?

OPAT staat voor Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapie, met andere woorden ambulante parenterale antimicrobiële therapie.

Ambulant staat voor het feit dat de patiënt niet (meer) bent opgenomen in het ziekenhuis. Dit is de zogenaamde thuishospitalisatie. Een thuisverpleegkundige zal meerdere dagen bij u thuis langskomen.

Parenteraal staat voor intraveneuze (in de aders, of de bloedbaan) of intramusculaire (in de spieren) toediening. Dat wil zeggen dat het geneesmiddel via een injectie of via een infuus rechtstreeks in de bloedbaan wordt toegediend.

Antimicrobieel staat voor de werking tegen micro-organismen. Dit kunnen zowel bacteriën, virussen als schimmels zijn.

Voordelen

De voordelen hiervan zijn dat u in uw vertrouwde thuisomgeving verder kan genezen. Hierdoor moet u minder lang in het ziekenhuis verblijven en kan u sneller de dagelijkse activiteiten hervatten. Wij streven er zo naar u een betere kwaliteit van zorg te bieden.

Wie komt in aanmerking voor antibioticatherapie thuis?

Uw behandelende arts in het ziekenhuis beslist in overleg met een multidisciplinair team (een arts gespecialiseerd in infectieziekten, sociale dienst, een ziekenhuisapotheker,...) of u in aanmerking komt voor een behandeling met parenterale antibioticatherapie thuis. Zij gaan na of aan alle nodige voorwaarden wordt voldaan. Uw behandelend arts zal alle aspecten van deze behandeling voorafgaand met u bespreken.

U, als patiënt, maakt de uiteindelijke keuze voor ontslag met verderzetting van de antibioticatherapie thuis. Bij een akkoord via geïnformeerde toestemming (informed consent) zullen de zorgverleners in het ziekenhuis starten met de verdere ontslagregeling. Dit neemt een tweetal werkdagen in beslag vanaf u de toestemming hebt gegeven.

Waar haalt u uw geneesmiddel?

Alle geneesmiddelen zullen worden meegegeven via de ziekenhuisapotheek. Bij ontslag uit het ziekenhuis zal u direct een voorraad van het geneesmiddel meekrijgen.

Indien dit geneesmiddel gedurende een periode langer dan twee weken thuis zal toegediend worden, dan zal er in tussentijd nog een consultatie ingepland worden bij uw behandelend arts. Op deze manier kan de therapie geëvalueerd worden. Na deze consultatie zal de patiënt dan in de apotheek van het H. Hartziekenhuis Mol de resterende medicatie kunnen komen ophalen.

Bewaren van het geneesmiddel

Bijna alle geneesmiddelen moeten worden bewaard op kamertemperatuur: tussen de 15°C en 25°C. Ze dienen bewaard te worden in de originele verpakking, op een droge en propere plaats, niet in direct zonlicht of dichtbij een warmtebron.

Negaban® (=temocilline) is de enige uitzondering: Dit moet in de koelkast bewaard worden. Om ook tijdens het transport naar huis een koele temperatuur te kunnen garanderen krijgt de patiënt dit geneesmiddel mee in een koeltas met koelelementen. Bij thuiskomst kan de patiënt Negaban® dan onmiddellijk in de koelkast bewaren.

Alle geneesmiddelen dienen buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Medisch materiaal

Al het nodige hulpmateriaal zoals naalden, spuitjes, leidingen,... krijgt de patiënt samen met het geneesmiddel mee bij ontslag uit het ziekenhuis. Indien de patiënt toch materiaal tekort zou komen, kan hij dit laten weten via de thuisverpleegkundige.

Gelieve geen medisch materiaal uit de verpakking te halen, maar alles te bewaren in de originele verpakking.

Het geneesmiddel wordt toegediend via een katheter. Er zijn verschillende mogelijkheden nl. een perifere katheter, een PICC-katheter of een poortkatheter.

Een **perifere katheter** is een kleine, korte katheter of een slangetje in kunststof. De katheter wordt met een naald in de bloedbaan gebracht. Na de plaatsing verwijderen we de naald en blijft enkel de katheter in het bloedvat zitten.

PICC is de afkorting voor perifeer ingebrachte centrale katheter. Het is een dun slangetje (katheter) dat via een bloedvat in je bovenarm wordt ingebracht tot net boven het hart.

Een **poortkatheter** (port-à-cath) is een katheter (een dun buisje) met een reservoir die wordt ingeplant in een grote ader onder uw sleutelbeen

Deze katheters worden geplaatst tijdens de opname van de patiënt in het ziekenhuis en kunnen gedurende de hele therapieduur ter plaatse blijven.

De verpleegkundige krijgt van H.H.Mol een informatiebrochure mee met daarin de concrete toedieningsinstructies voor de verschillende katheters.

Duurtijd van de thuisterapie

Een thuisverpleegkundige zal één of meerdere malen per dag langskomen, in functie van het type geneesmiddel en de voorschriften van de behandelende arts.

Ook de duur van de behandeling is variabel en zal met de patiënt besproken worden. Dit is afhankelijk van het type infectie, het gebruikte antibioticum, de evolutie van het infectieus probleem en de karakteristieken van de patiënt.

Welke kosten zijn hieraan verbonden

Sinds 01 juli 2023 zijn alle kosten van de geneesmiddelen rond thuishospitalisatie volledig terugbetaald door de overheid. Dat betekent dat de patiënt ook geen remgeld betaalt voor de geneesmiddelen.

Andere zaken zoals infusen en oplosmiddel vallen hierbuiten. Hierop betaalt de patiënt een remgeld, al is de kost hiervan redelijk beperkt. Dit kan wordt echter vaak gedekt door een hospitalisatieverzekering.

Wat te doen bij problemen?

De thuisverpleegkundige zal dagelijks een aantal parameters invullen op een observatieblad om uw toestand op te volgen. Dit parameterblad dient bij elke opvolgconsultatie bij uw behandelend arts meegebracht te worden. Wanneer de therapie gestopt is, dient dit blad eveneens bezorgd te worden aan uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Bij (praktische) problemen (zoals onvoldoende materiaal of geneesmiddel) dient de patiënt zich best eerst tot de thuisverpleegkundige te wenden.

Contactgegevens Heilig Hartziekenhuis Mol

Contact opnemen met de afdeling waar u opgenomen was.

Afdeling inwendige ziekten 014/71.22.20

Afdeling heelkunde 014/71.21.20

Afdeling cardiologie 014/71.24.49

Andere (tijdens kantooruren):

Sociale dienst 014/71.20.81

Ziekenhuisapotheek 014/71.22.82