AZ MOL

PERIFEER INGEBRACHTE CENTRALE CATHETER (PICC)

INTERNE GENEESKUNDE

Klein in schaal, gróót in zorg

OVERZICHT

→ Klik op een titel om rechtstreeks naar de gewenste informatie te gaan.

» Wat is een PICC-katheter

» Algemene aandachtspunten


» Instructies voor opvolging

» Richtlijnen voor de thuisverpleegkundige

TERUG NAAR OVERZICHT

WAT IS EEN PICC-KATHETER

Een PICC-katheter is een dun slangetje dat via een bloedvat in de bovenarm ingebracht wordt. Het wordt opgeschoven in het bloedvat tot het uiteinde zich net boven het hart bevindt. Uitwendig blijft enkele cm van het slangetje (al dan niet met een klem) en een afsluitdopje zichtbaar. Het slangetje wordt met een fixatieverband op de huid vastgemaakt zonder dat dit gehecht wordt. Een doorzichtig eindverband sluit het geheel af.



ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

- Nemen van een bad en zwemmen is niet toegestaan. Douchen kan mits het verband droog blijft (bijvoorbeeld met vershoudfolie of een waterdichte mouw).
- Geen knelband aanleggen (voor eventuele bloedafname of bloeddruk meten) aan de arm waarin de PICC-katheter geplaatst is.
- Sporten waarbij de arm zwaar belast wordt vermijden (gewichtheffen, opdrukken) . Rustig sporten is toegestaan.
- Vermijd tillen van zware lasten.
- Let erop dat de klem steeds dichtstaat (indien er een katheter met klem geplaatst is) en dat er een afsluitdopje op het uiteinde aanwezig is.

INSTRUCTIES VOOR OPVOLGING

Neem contact op met de thuisverpleegkundige of met de afdeling waar u opgenomen was wanneer u één van volgende zaken opmerkt:

- koorts (> 38.5°C) of koude rillingen
- lokale infectietekens: zwelling, roodheid, warmte, etter
- bloedverlies thv insteekplaats
- pijn thv schouder of arm, toegenomen kortademigheid of pijn op de borst

- katheter is uit de insteekplaats geschoven
- beschadiging van de katheter (vb. lekkage)

Afdeling interne geneeskunde: 014/71.22.20
Afdeling heelkunde: 014/71.21.20

RICHTLIJNEN VOOR DE THUISVERPLEEGKUNDIGE

TOEDIENEN VAN ANTIBIOTICA EN SPOELEN

- was uw handen en ontsmet ze met handalcohol
- controleer of de klem van de katheter toe staat indien een katheter met klem geplaatst is
- hou een steriel kompres dat bevochtigd is met Chloorhexidine 0.5% in alcohol onder het inspuitpunt van de katheter
- verwijder het afsluitdopje en gooi dit weg
- dien het antibioticum toe volgens voorschrift: in bolus of via minibag
- spoel nadien met NaCl 0,9% (PosiFlush®) pulserend
- indien een katheter met klem geplaatst is: sluit de klem terwijl je de laatste 3 ml inspuit (onder positieve druk)
- breng een nieuw afsluitdopje aan

WEKELIJKSE VERBANDZORG (ONTSMETTING EN WISSEL VAN STATLOCK®)

Hiervoor verwijzen we graag naar de brochure BARD PICC van de firma BD vanaf pagina 16.
Ter aanvulling bij pagina 18:

- punt 1: gebruik hiervoor Chloorhexidine 0.5% in alcohol
- punt 6: gebruik hiervoor Tegaderm® en noteer de datum op het verband

Tip: Op de website van de Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers kan u tevens een filmpje over ‘katheterzorg’ raadplegen, met name E-learning OPAT.
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en/of verpleegkundige zijn steeds bereid om hierop een antwoord te geven.

TERUG NAAR OVERZICHT

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van het AZ Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Revisiedatum	Auteur	Kwalificaties auteur
juli 2026	Dirk Huysmans	Hoofdverpleegkundige Interne Geneeskunde

AZ MOL

Adres: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
E-mail: info@azmol.be
Website: www.azmol.be
Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Spoedgevallen: 014 71 23 92