

Persoonlijk wasgoed tijdens de hospitalisatie

U kan het linnen best meegeven in een plastic zak en apart wassen. Indien een bezoeker wasgoed meeneemt om thuis te wassen, volstaat het om de kleding op de hoogst mogelijke temperatuur te wassen.

Als het linnen in de wasmachine zit, dient men de handen te wassen.

Eenmaal gewassen, is het linnen vrij van bacteriën.

Maatregelen voor thuis

De huisarts (eventueel de thuisverpleging) of de instelling waar u naartoe gaat, wordt verwittigd over het dragerschap of de ontsteking.

Gezonde medebewoners hoeven niet bang te zijn voor een met MRSA besmette persoon. In geval van samenwonen met vatbare personen, zoals kinderen (jonger dan 12 jaar), ouderen (ouder dan 65 jaar) en langdurig zieken, moet u extra aandacht schenken aan een **goede handhygiëne**.

Dit wil zeggen:

De handen wassen na gebruik van het toilet, na het snuiten van de neus, voor en na het eten.

Ook hoesthygiëne (een wegwerpzakdoek houden voor de mond tijdens het hoesten en niezen) bevelen we sterk aan.

Screening thuis is niet nodig. Als u reeds drager was van de bacterie moet u bij een nieuwe opname in het ziekenhuis een nieuwe screening ondergaan.

Voor vragen kan u zich steeds wenden tot uw behandelende arts, de verpleging of de ziekenhuishygiënist van het H. Hartziekenhuis Mol.

Wij wensen u een spoedig herstel.

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Datum laatste aanpassing: 8 oktober 2018

Naam auteur / verantwoordelijke: Team Ziekenhuishygiëne / P. Verbeeck

Kwalificaties auteur: Apotheker-Bioloog



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Informatie voor de familie
MRSA isolatie

WELKOM

BIJ HET
H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Wat is MRSA?

MRSA staat voor **Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus**.

Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Gewoonlijk veroorzaken stafylokokken geen problemen. Toch kunnen deze bacteriën in het lichaam indringen en een infectie veroorzaken. Deze infectie geneest in principe vanzelf, soms is het nodig de infectie te behandelen met antibiotica.

MRSA is een stafylokok die niet meer gevoelig is voor de gebruikelijke antibiotica. Vooral mensen met een verminderde weerstand zijn vatbaarder voor MRSA. Voor gezonde personen is er geen gevaar.

Screening

Het kan zijn dat u vóór of tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de bacterie hebt opgelopen. Daar merkt u zelf niets van. Om na te gaan of u met deze bacterie in aanraking gekomen bent en deze nog bij u draagt, zijn wij genoodzaakt enkele controlestalen bij u af te nemen. Met een wattenstokje worden slijmvlies van keel- en neusholte en eventueel de huid diep in de liesplooï en wondjes bestreken. Dit materiaal wordt onderzocht.

Als blijkt dat de stalen positief zijn, betekent het dat u **drager** bent van de MRSA-bacterie, u bent niet noodzakelijk ziek maar u wordt in **isolatie verpleegd** om verdere besmetting te voorkomen.

U bent drager van MRSA?

U draagt MRSA in de neus, de keel, de bilnaad en/of de liesplooï, maar u bent niet noodzakelijk ziek. U krijgt een behandeling met een zalf die de bacterie doodt en een ontsmettende zeep om u te wassen. U wordt niet geïsoleerd, behalve indien u verblijft op intensieve zorgen, heelkunde of neonatologie. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding van de bacterie te vermijden.

U heeft een ontsteking met MRSA?

U wordt bij voorkeur verzorgd op een éénpersoonskamer (isolatie). Het linnen en afval worden apart verwijderd. U wordt gevraagd op de kamer te blijven tot de maatregelen worden opgeheven. U heeft bij voorkeur geen contact met andere patiënten. Het ziekenhuispersoneel zal handschoenen, een masker en een schort dragen op uw kamer en de handen regelmatig ontsmetten. Deze voorzorgsmaatregelen vragen we aan alle zorgverleners die in de kamer komen (artsen, verpleegkundigen, onderhoudspersoneel,...). Vervoer naar andere diensten (onderzoek, therapie,...) gebeurt slechts wanneer dit strikt noodzakelijk is. Sommige onderzoeken gebeuren dan ook op de kamer.

Mag ik bezoek ontvangen?

U kunt gewoon bezoek ontvangen.

Hoe kunnen bezoekers helpen?

Bij het verlaten van de kamer moeten de handen van de bezoekers ontsmet worden met handalcohol.

Enkel als uw bezoekers nog andere patiënten bezoeken of voor de verzorging van zieken bij hen thuis instaan, dienen zij schort, handschoenen en een masker te dragen in de kamer en de handen te ontsmetten bij het verlaten van de kamer. **De beschermkledij wordt enkel in de kamer gedragen, niet in de gang. Bij het verlaten van de kamer wordt de beschermkledij in de vuilbak op de kamer gedeponeerd.**

De behandeling

Als blijkt dat u drager bent van MRSA wordt volgende behandeling opgestart:

Ontsmetting van de neus:

Behandeling met neuszalf, 3 maal per dag gedurende 5 dagen.

De behandeling wordt na 5 dagen stopgezet en gevolgd door een nieuwe screening.

Ontsmetting van de huid:

Behandeling door het wassen van het lichaam met antiseptische zeep: 1 maal per dag gedurende 5 dagen.

De behandeling wordt na 5 dagen stopgezet en gevolgd door een nieuwe screening.

Ontsmetting van de keel:

Behandeling met Isobetadine mondwater gedurende 5 dagen. De behandeling wordt na 5 dagen stopgezet en gevolgd door een nieuwe screening.

In geval van ontsteking stelt de behandelende arts bijkomende maatregelen voor. De arts kan beslissen om gedurende een bepaalde periode een antibioticum toe te dienen. De behandeling kan per persoon verschillend zijn.

Als de uitslag van de screening 3 maal **negatief** is en u dus géén MRSA-drager bent, kunnen de extra maatregelen opgeheven worden en hoeft u niet meer geïsoleerd verpleegd te worden.

Op de dag van het opheffen van de isolatie krijgt u nog een ontsmettend bad, er wordt zuivere kledij aangetrokken en u komt in een bed met zuiver linnen.

Verhoogde aandacht voor handhygiëne wordt evenwel verder aangehouden.

De behandelende arts beslist wanneer de bijkomende maatregelen en behandeling stopgezet kunnen worden.

