



Naam Patiënt:.....

Verwijzende arts:.....

Datum:.....

#### KLACHTENPATROON

##### Lumbaal / Sacraal

- |  |   |                                      |                                     |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Links                  | <input type="radio"/> Rechts                              | Sedert:.....mnd                      | Radiculair: .....mnd                |
| <input type="radio"/> Lumbalgie              |   |                                      | <input type="radio"/> Facet/SIG     |
|  |   |                                      | <input type="radio"/> Facet/SIG     |
| <input type="radio"/> Discogene pijnklachten | <input type="radio"/> Discus.....                         | <input type="radio"/> Proef/PRF      | <input type="radio"/> r.communicans |
|  |   | <b>&lt; 6 maanden</b>                | <b>&gt; 6 maanden</b>               |
| <input type="radio"/> Radiculair             | <input type="radio"/> Bovenbeen                           | <input type="radio"/> TFL3           | <input type="radio"/> proef/PRF L3  |
|  | <input type="radio"/> Scheenbeen                          | <input type="radio"/> TFL4           | <input type="radio"/> proef/PRF L4  |
|  | <input type="radio"/> Grote teen                          | <input type="radio"/> TFL5           | <input type="radio"/> proef/PRF L5  |
|  | <input type="radio"/> Kleine teen/voetzool/kuit           | <input type="radio"/> TFS1           | <input type="radio"/> proef/PRF S1  |
|  | <input type="radio"/> Bilateriaal - spinaal kanaalstenose | <input type="radio"/> LEI            |                                     |
| <input type="radio"/> Voosheid               | <input type="radio"/> Paresthesieën                       | <input type="radio"/> Allodynie..... |                                     |

##### Cervicaal/Occipitaal

- |                                      |  |                                      |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Links          | <input type="radio"/> Rechts                     | Sedert:.....mnd                      | Radiculair: .....n                               |
| <input type="radio"/> Cervicalgie    | <input type="radio"/> Nek/ cervicogene hoofdpijn |                                      | <input type="radio"/> Facet C3-4-5               |
|                                      | <input type="radio"/> Nek/ Schouderregio         |                                      | <input type="radio"/> Facet C4-5-6               |
| <input type="radio"/> Occiput/vertex |  |                                      | <input type="radio"/> n. Occipitalis infiltratie |
|                                      |  | <b>&lt; 6 maanden</b>                | <b>&gt; 6 maanden</b>                            |
| <input type="radio"/> Radiculair     | <input type="radio"/> Duim (C6)                  | <input type="radio"/> CEI            | <input type="radio"/> proef/PRF C6               |
|                                      | <input type="radio"/> Digit II-IV (C7)           | <input type="radio"/> CEI            | <input type="radio"/> proef/PRF C7               |
|                                      | <input type="radio"/> Pink (C8)                  | <input type="radio"/> CEI            | <input type="radio"/> proef/PRF C8               |
| <input type="radio"/> Voosheid       | <input type="radio"/> Paresthesieën              | <input type="radio"/> Allodynie..... |  |

##### Andere

- Medicamenteuze therapie en/of opvolging
- Eventuele doorverwijzing naar multidisciplinair pijncentrum
- uitgebreide raadpleging
- Andere:.....

<b>Legende:</b>	TF: Transforaminale epidurale infiltratie	SIG: Sacro-iliacale gewricht infiltratie
	LEI: Lumbale epidurale infiltratie	PRF: gepulseerde radiofrequente behandeling
	CEI: Cervicale epidurale infiltratie	RF: radiofrequente behandeling
	Facet: Facetinfiltratie	Proef: diagnostische behandeling



**BEELDVORMING**

- Botscan: .....
- NMR: .....
- CT: .....
- RX: .....
- EMG: .....
- Andere: .....

**MEDICATIE**

- Pijnmedicatie .....
- Overige medicatie .....
- Bloedverdunners

**Aspirine**

- Asaflow       Cardioaspirine       Persantine       Aggrenox

Gestopt sinds:.....Vervangen door: .....

**Coumarines**

- Marcoumar       Sintrom       Marevan       Marevan

Gestopt sinds:.....Vervangen door: .....

**Thiënoprydines:**

- Plavix       Ticlid       Efiënt       Brilique

Gestopt sinds:.....Vervangen door: .....

**Noax**

- Eliquis       Pradaxa       Xarelto       Lixiana

Gestopt sinds:.....Vervangen door: .....

**LMWH**

- Clexane       Fraxiparine       Fragmin       Fraxodi

Gestopt sinds:.....Vervangen door: .....

**FOLLOW-UP NA BEHANDELING PIJNKLINIEK**

- Terugverwijzing aanvrager
  - acute raadpleging
  - reguliere raadpleging
- Verdere opvolging raadpleging Pijnkliniek Mol
- Andere:.....

**Secretariaat Pijncentrum Mol:**

Tel: 014/71.24.55

**Verantwoordelijke arts:**

Dr. Gaby Kox